



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G. Rodolico– San Marco"
P.O G. Rodolico
Clinica Ginecologica e Ostetrica
Direttore Prof.ssa L. Mereu

Informativa su vaccinazioni in gravidanza

I vaccini raccomandati in gravidanza sono quelli contro:

- **INFLUENZA STAGIONALE**
- **PERTOSSE (vaccino combinato dTpa)**
- **COVID-19**

L'influenza stagionale aumenta il rischio di prematurità, basso peso alla nascita, interruzione di gravidanza

I neonati di mamme immunizzate in gravidanza hanno un rischio ridotto di contrarre l'infezione e otiti

- ➔ Il vaccino anti-influenzale è sicuro in tutte le fasi della gravidanza, tuttavia si raccomanda la sua somministrazione nel 2°-3° trimestre a scopo precauzionale, se in questa fase della gravidanza la gestante si trova nella stagione epidemica.

La **Pertosse** quando è contratta dal neonato nei primi mesi di vita può avere un decorso molto grave. La fonte infettiva è spesso la madre. Il rischio di ricovero per i bimbi al di sotto dei 12 mesi è 10 volte maggiore per le mamme non vaccinate in gravidanza

- ➔ E raccomandata la somministrazione di una singola dose durante il terzo trimestre di ogni gravidanza
- ➔ Il periodo per eseguire la vaccinazione è dalla 27° settimana alla 36a settimana di gestazione.
- ➔ Si suggerisce di eseguire la dose alla 28a settimana per permettere alle future mamme la produzione di sufficienti quantità di anticorpi che con il passaggio attraverso la placenta proteggeranno il nascituro nei primi mesi.

Infezione da COVID-19 durante la gravidanza aumenta le probabilità di complicanze anche serie.

- ➔ Recenti raccomandazioni suggeriscono di offrire la vaccinazione a tutte le donne in gravidanza e post-partum ed anche in allattamento. Sono disponibili vaccini adattati alla variante Omicron.
- ➔ Una dose di richiamo è raccomandata a distanza di 6 mesi dall'ultima dose di vaccino anti Covid-19 ricevuta o dall'ultima infezione, a prescindere dal numero di dosi ricevute.



*Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G. Rodolico– San Marco"
P.O G. Rodolico
Clinica Ginecologica e Ostetrica
Direttore Prof.ssa L. Mereu*

Alcune vaccinazioni non sono raccomandate durante la gravidanza per motivi precauzionali o per l'assenza di un rischio consistente di infezione (haemofilus, pneumococco, meningococco, epatite, encefalite, poliomelite, colera) altre per mancanza di dati (HPV, febbre gialla) e possono essere semplicemente rimandate, mentre sono controindicati i vaccini con virus vivi attenuati (morbillo, parotite, rosolia, herpes zoster, rotavirus).

Ambulatori per la vaccinazione ASP di Catania

Area metropolitana

Catania, Corso Italia 234 tel 095/2545236
ricevimento da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e martedì e giovedì 15.30-17.30

Catania, Viale Fleming 24 tel 095/8250187
ricevimento da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e martedì e giovedì 15.30-17.30

Catania, Stradale S. Giorgio 105, tel 095/09389760
ricevimento da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e martedì e giovedì dalle 15.30-17.30

Catania, via Frassati 2, tel 095/241791
ricevimento da lunedì a venerdì 8.30/12.30

Area territoriale

Misterbianco, Via Garibaldi 41-43 tel 095/2545652
ricevimento da lunedì a venerdì h 8.30-12.30 e martedì 15.30-17.30

Acicastello, Via Stazione 3 tel 095/7677702
ricevimento da lunedì a venerdì h 8.30-12.30

Acireale, via G Martinez 19 tel 095/7677856
ricevimento da lunedì a venerdì h 8.30-12.30 e martedì e giovedì 15.30-17.30