

CRITERI DI ELEGGIBILITÀ AL TRATTAMENTO OPAT

Patologie per le quali è possibile attivare la terapia OPAT:

- **Infezioni delle ossa e delle articolazioni:** Osteomielite, Artrite settica, Protesi infette.
- **Infezioni della pelle e dei tessuti molli:** Cellulite, Fascite necrotizzante.
- **Infezioni del tratto respiratorio:** Polmoniti complicate (che necessitano di trattamenti antibiotici prolungati), Ascesso polmonare.
- **Infezioni del tratto urinario:** Pielonefrite complicata (quando non risponde a trattamenti orali o richiede un trattamento prolungato), Infezioni urinarie ricorrenti in pazienti cateterizzati.
- **Endocardite infettiva**
- **Batteriemie**
- **Ascessi intra-addominali**
- **Infezioni di impianti e dispositivi medici:** Infezioni di cateteri o dispositivi medici impiantati (come pacemaker o stent) che necessitano di antibiotici specifici per via endovenosa per prevenire o trattare infezioni più gravi.
- **Infezioni complicate da diabete:** in particolare, infezioni del piede diabetico che possono richiedere trattamenti a lungo termine.
- **Profilassi antimicrobica in pazienti immunocompromessi** che necessitano di una profilassi prolungata con antibiotici da somministrare per via endovenosa.
- **Infezioni dopo interventi chirurgici:** infezioni post-operatorie, come infezioni del sito chirurgico, che richiedono trattamenti antibiotici estesi, ma che non necessitano di un ricovero prolungato.
- **Malattie infettive croniche:** alcune malattie croniche come la **tubercolosi multiresistente** o altre infezioni batteriche particolari che necessitano di terapie antibiotiche a lungo termine.
- **Patologie infettive della colonna vertebrale:** Spondilodiscite, Ascessi spinali epidurali, Infezioni post-operatorie della colonna

Criteri clinici generali:

- Diagnosi che rientra tra quelle sopra riportate
- Paziente che necessita di terapia antibiotica per via endovenosa;
- Paziente che non necessita di ricovero ordinario, o paziente altrimenti dimissibile;
- Presenza, o possibilità di posizionamento, di un accesso venoso stabile e di calibro adeguato (PICC, MidLine).

Criteri sociali:

- Pazienti che abbiano la possibilità di accedere quotidianamente / ogni 48 ore al servizio di Day Hospital infettivologico presso il P.O. San Marco per tutta la durata prevista della terapia.

