

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico
"G. Rodolico - San Marco" - Catania

REPORT PROGRAMMA NAZIONALE ESITI

Edizione 2025 - Dati relativi all'anno 2024



U.O. Per la Qualità e Rischio Clinico

INDICE

LE TREEMAP DELLE AZIENDE OSPEDALIERE CATANESI	3
Standard di qualità	3
Legenda treemap.....	3
P.O. G. Rodolico.....	4
P.O. S. Marco	4
A.O. Cannizzaro	5
P.O. Garibaldi Centro.....	5
P.O. Garibaldi Nesima.....	6
DETTAGLIO DEI P.O. DELL'A.O.U.P. "G. RODOLICO – SAN MARCO"	7
Legenda	7
P.O. G. Rodolico.....	7
P.O. San Marco	8
Riepilogo indicatori.....	9
Indicatori di volume.....	9
Indicatori di esito.....	13

LE TREEMAP DELLE AZIENDE OSPEDALIERE CATANESI

Standard di qualità

Standard di qualità							
			Standard di qualità				
			MOLTO ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO
Area clinica	Indicatore	Peso	1	2	3	4	5
CARDIOCIRCOLATORIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	30%	≤ 6	6-18	8-12	12-14	> 14
	IMA STEMI: % trattati con PTCA entro 90 minuti	15%	≥ 60	50-60	40-50	20-40	< 20
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	10%	≤ 6	6-9	9-14	14-18	> 18
	By-pass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	15%	≤ 1.5		1.5-4		> 4
	By-pass totale: volumi di ricoveri	5%	≥ 200		100-200		< 100
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	15%	≤ 1.5		1.5-4		> 4
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	10%	≤ 1		1-3		> 3
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	75%	≤ 8	8-10	10-14	14-16	> 16
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	25%	≤ 1.5		1.5-3.5	3.5-5	> 5
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	100%	≤ 5	5-7	7-12	12-16	> 16
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	30%	≥ 100		50-100		< 50
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	70%	≥ 80	70-80	60-70	50-60	< 50
CH. ONCOLOGICA	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	16%	≤ 5	5-8	8-12	12-18	> 18
	Intervento chirurgico per TM della mammella: volume di ricoveri	10%	≥ 150	135-150	100-135		< 100
	Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	14%	≥ 72	72-59	59-45	45-26	< 26
	Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	10%	≥ 96	85-96	50-85	21-50	≤ 20
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	20%	≤ 0.5		0.5-3		> 3
	Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	10%	≥ 50	45-50	21-45		≤ 20
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	20%	≤ 1	1-3	3-6	6-8	> 8
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (vol: 1000)	45%	≤ 10	10-20	20-30	30-35	> 35
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (vol ≥ 1000)		≤ 20	20-25	25-30	30-35	> 35
	Parti: volume di ricoveri	25%	≥ 1000		500-1000		< 500
	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	15%	> 40	25-40	13-25	5-13	≤ 5
	Proporzione di episiotomie in parti vaginali	15%	≤ 5	5-10	10-15	15-20	> 20
OSTEOMUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48h	50%	≥ 70	60-70	40-60	30-40	< 30
	Interventi per frattura del collo del femore: volume di ricoveri	5%	≥ 75		50-75		< 50
	Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	5%	≥ 100		50-100		< 50
	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	15%	≤ 3		3-9		> 9
	Intervento per protesi di ginocchio: volume di ricoveri	10%	≥ 100		50-100		< 50
	Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	15%	≤ 3		3-9		> 9
NEFROLOGIA	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	100%	≤ 3.3	3.3-7.3	7.3-12.4	12.4-20.5	> 20.5

Legenda treemap




Area proporzionale al volume di attività

Dettaglio degli indicatori rappresentativi dell'area clinica

- Molto Basso
- Basso
- Medio
- Alto
- Molto Alto
- ND


P.O. G. Rodolico




P.O. S. Marco




A.O. Cannizzaro



P.O. Garibaldi Centro



P.O. Garibaldi Nesima



DETTAGLIO DEI P.O. DELL'A.O.U.P. "G. RODOLICO - SAN MARCO"

Legenda



⚠ Volume di attività inferiore alla soglia (tolleranza del 10%) fissata dal regolamento riguardante la Definizione degli standard ospedalieri (DM Saluta 70/2015) o desumibile dalla letteratura scientifica

👁 Strutture a cui è stato richiesto di avviare una procedura di audit sulla qualità dei dati

P.O. G. Rodolico

AREA CLINICA	INDICATORE	N	% Adj	% Italia	Vol. Operatore	Audit
CARDIOCIRCOLATORIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	326	6.52	6.78	.	
	IMA STEMI: % trattati con PTCA entro 90 minuti	203	75.23	57.58	.	
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	498	4.36	9.39	.	
	By-pass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	388	2.93	1.51	.	
	By-pass totale: volumi di ricoveri	247	-	-	93	
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	854	3.61	2.07	.	
NERVOSO	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	178	1.75	1.46	.	
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	60	2.42	9.16	.	
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	112	12.29	9.14	.	
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	287	-	-	⚠ 43	
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post operatoria < 3 giorni	173	88.85	85.89	.	
CH. ONCOLOGICA	Prop. di interventi di resezione entro 120gg da int. conservativo per TM mammella	107	2.89	5.07	.	
	Intervento chirurgico per TM della mammella: volume di ricoveri	181	-	-	117	
	Prop. di int.demolitivi per TM mammella con contestuale ricostruzione/inserzione	32	74.01	70.32	.	
	Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	95	-	-	76	
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	175	0.27	0.85	.	
	Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	71	-	-	⚠ 28	
GRAVIDANZA E PARTO	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	118	7.31	3.52	.	
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	854	31.76	22.19	.	
	Parti: volume di ricoveri	1086	-	-	.	
	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	208	3.08	11.81	.	👁
OSTEOMUSCOLARE	Proporzione di episiotomie in parti vaginali	565	9.72	9.06	.	
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48h	186	53.19	60.49	.	
	Interventi per frattura del collo del femore: volume di ricoveri	238	-	-	⚠ 42	
	Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	116	-	-	54	
	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	81	5.34	3.21	.	
	Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	17	-	-	⚠ 11	

P.O. San Marco

AREA CLINICA	INDICATORE	N	% Adj	% Italia	Vol. Operatore	Audit
CARDIOCIRCOLATORIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	139	7.18	6.78	.	⊕
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	75	18.58	9.39	.	
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	53	4.47	1.46	.	
NERVOSO	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	223	5.49	2.75	.	⊕
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	64	1.81	9.14	.	
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	139	-	-	54	
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post operatoria < 3 giorni	104	91.84	85.89	.	
CH. ONCOLOGICA	Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	42	-	-	⚠ 25	
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	74	7.70	3.52	.	
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1472	28.09	22.19	.	
	Parti: volume di ricoveri	1896	-	-	.	
	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	344	3.53	11.81	.	⊕
	Proporzione di episiotomie in parti vaginali	957	31.00	9.06	.	⊕
OSTEOMUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48h	59	34.45	60.49	.	
	Interventi per frattura del collo del femore: volume di ricoveri	83	-	-	⚠ 28	
	Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	41	-	-	⚠ 29	
NEFROLOGIA	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	292	4.98	7.31	.	

Riepilogo indicatori

Indicatori di volume

Indicatore	P.O. G. Rodolico	P.O. San Marco	A.O. Cannizzaro	ARNAS Garibaldi - Centro	ARNAS Garibaldi - Nesima
Volume di PTCA eseguite per condizioni diverse dall'Infarto Miocardico Acuto	395	70	244	24	2
PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica	768	179	558	86	2
PTCA in pazienti STEMI: volume di ricoveri	264	11	168	2	0
PTCA in pazienti NSTEMI: volume di ricoveri	99	92	138	60	0
Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri	160	107	176	1	148
Bypass aorto-coronarico isolato: volume di interventi	211	0	0	0	0
Bypass totale: volume di ricoveri	247	0	0	0	0
STEMI: volume di ricoveri	281	15	184	7	1
NSTEMI: volume di ricoveri	229	141	223	163	5
Infarto Miocardico Acuto a sede non specificata: volume di ricoveri	17	12	11	2	2
Infarto Miocardico Acuto: volume di ricoveri	527	168	418	172	8
Infarto Miocardico Acuto: volume di ricoveri con trombolisi	0	1	0	0	0
Volume di ricoveri per Infarto Miocardico Acuto complicato da scompenso cardiaco	81	10	28	29	0
Riparazione di aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri	96	34	91	0	35
Riparazione di aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri	8	3	5	0	0
Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica	3	3	13	0	0
Rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia	56	67	165	2	68
Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri	59	70	178	2	68
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	587	97	151	108	211
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	626	148	172	111	212
Intervento chirurgico di legatura o stripping di vene: volume di ricoveri	11	64	3	0	0
Trombosi Venose Profonde: volume di ricoveri	2	0	2	0	4

Indicatore	P.O. G. Rodolico	P.O. San Marco	A.O. Cannizzaro	ARNAS Garibaldi - Centro	ARNAS Garibaldi - Nesima
Embolia polmonare: volume di ricoveri	105	75	75	60	26
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: volume di ricoveri	441	0	0	0	0
Intervento di sostituzione di valvola aortica per via transcatetere: volume di ricoveri	4	0	0	0	0
Intervento di sostituzione di valvola aortica: volume totale di ricoveri	345	0	0	0	0
Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola mitralica: volume totale di ricoveri	95	0	0	0	0
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	8	11	47	16	3
Ictus ischemico: volume di ricoveri	73	60	419	276	12
Ictus ischemico: volume di ricoveri con trombolisi	0	0	65	38	0
Volume di trombectomie in pazienti con ictus ischemico	3	11	74	61	8
Riparazione di aneurisma cerebrale non rotto: volume di ricoveri	0	3	12	7	0
Riparazione di aneurisma cerebrale rotto: volume di ricoveri	0	1	9	4	0
BPCO: volume di ricoveri ordinari	162	92	43	32	83
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	329	143	146	4	375
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	287	139	134	3	339
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	42	4	12	1	36
Intervento chirurgico per tumore cerebrale: volume di craniotomie	3	82	115	34	2
Intervento chirurgico isolato per TM colon con approccio mini-invasivo: volume di ricoveri	25	21	13	0	82
Intervento chirurgico isolato per TM retto con approccio mini-invasivo: volume di ricoveri	7	9	1	1	18
Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	95	4	85	0	11
Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri	9	6	4	0	19
Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri	0	0	0	0	15
Intervento chirurgico isolato per TM colon: volume di ricoveri	71	42	43	0	144
Intervento chirurgico per TM esofago: volume di ricoveri	2	3	0	0	0
Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri	6	4	1	0	22
Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri	181	4	381	0	144
Intervento chirurgico per TM colecisti: volume di ricoveri	3	1	0	0	9

Indicatore	P.O. G. Rodolico	P.O. San Marco	A.O. Cannizzaro	ARNAS Garibaldi - Centro	ARNAS Garibaldi - Nesima
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri	70	117	51	0	74
Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri	15	22	43	1	68
Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri	8	34	25	0	28
Intervento chirurgico isolato per TM retto: volume di ricoveri	13	9	5	1	37
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale	62	110	47	0	72
Intervento chirurgico per TM cavo orale: volume di ricoveri	2	10	5	0	3
Intervento chirurgico per TM ovaio: volume di ricoveri	13	2	94	0	30
Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri	64	0	3	0	62
Intervento di isterectomia per tumore maligno: volume di ricoveri	24	28	208	0	96
Intervento chirurgico per TM laringe (open): volume di ricoveri	10	0	50	0	5
Intervento chirurgico di resezione pancreatica per TM: volume di ricoveri	0	7	0	0	18
Intervento di prostatectomia radicale per TM della prostata con approccio mini invasivo: volume di ricoveri	31	93	36	0	43
Intervento di prostatectomia radicale con tecnica robotica per TM della prostata: volume di ricoveri	31	0	0	0	7
Intervento chirurgico con tecnica robotica per TM del polmone: volume di ricoveri	5	0	0	0	0
Intervento chirurgico per TM del polmone con approccio mini invasivo: volume di ricoveri	46	0	3	0	7
Intervento di isterectomia per TM maligno con approccio mini invasivo: volume di ricoveri	10	6	28	0	0
Intervento di isterectomia con tecnica robotica per tumore maligno: volume di ricoveri	10	3	0	0	0
Intervento chirurgico per TM del rene con approccio mini invasivo: volume di ricoveri	2	1	23	0	32
Intervento chirurgico con tecnica robotica per TM del rene: volume di ricoveri	0	0	0	0	1
Intervento chirurgico isolato con tecnica robotica per TM del retto: volume di ricoveri	5	6	0	0	8
Intervento chirurgico isolato con tecnica robotica per TM del colon: volume di ricoveri	20	11	0	0	20
Parti: volume di ricoveri	1086	1896	1161	1	2349
Parti con taglio cesareo: volume di ricoveri	477	813	521	0	755
Artodesi vertebrale: volume di interventi	1	279	225	117	3
Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri	4	0		3	3
Interventi per frattura del collo del femore: volume di ricoveri	238	83	303	195	9

Indicatore	P.O. G. Rodolico	P.O. San Marco	A.O. Cannizzaro	ARNAS Garibaldi - Centro	ARNAS Garibaldi - Nesima
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	247	85	307	201	10
Frattura della tibia e perone: volume di ricoveri	56	58	61	39	21
Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	116	41	125	125	33
Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	17	4	4	32	32
Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri	9	3	2	21	1
Isterectomia: volume di ricoveri	92	267	521	0	497
Prostatectomia: volume di ricoveri	66	106	62	0	91
AIDS: volume di ricoveri	0	2	0	0	7
Tonsillectomia: volume di ricoveri in età pediatrica	119	0	10	0	3
Tonsillectomia con adenoidectomia: volume di ricoveri in età pediatrica	103	0	7	0	2
Adenoidectomia senza tonsillectomia: volume di ricoveri in età pediatrica	37	0	71	0	325
Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in età pediatrica	30	1	0	0	1
Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in età pediatrica	17	5	6	0	59
Interventi cardiocirurgici in età pediatrica: volume di ricoveri	0	0	1	1	0
Trapianto di cornea: volume di ricoveri	89	0	0	0	20
Intervento chirurgico per impianto cocleare: volume di ricoveri	0	0	0	0	26
Intervento chirurgico su orecchio medio: volume di ricoveri	5	0	67	0	57
Intervento chirurgico per seni paranasali: volume di ricoveri	54	12	57	0	48
Trapianti di midollo osseo: volume di ricoveri	38	0	0	0	0
Trapianto del rene: volume di ricoveri	26	0	0	0	0
Scialoadenectomia: volume di interventi	20	27	43	0	28
Tonsillectomia: volume di interventi	153	2	11	0	25

Indicatori di esito

Indicatore	P.O. G. Rodolico		P.O. San Marco		A.O. Cannizzaro		ARNAS Garibaldi - Centro		ARNAS Garibaldi - Nesima		Italia
	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza
Proporzione di PTCA in STEMI su totale PTCA	34,47	/	6,18	/	30,31	/	2,33	/	0	/	23,43
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti dall'accesso nella struttura di ricovero/service	75,37	75,23	38,46	/	69,18	69,64	0	/	0	/	57,58
STEMI: proporzione di PTCA entro 90 minuti sul totale dei trattati con PTCA entro 12h dall'accesso nella struttura di ricovero/service	85,88	85,87	62,5	/	79,71	79,97	0	/	/	/	76,5
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	4,17	5,27	5,26	7,73	4,88	4,03	/	/	0	/	4,59
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	12,5	10,78	14,47	14,2	21,95	20,91	/	/	11,77	/	16,33
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	4	4,84	6,17	11,41	4,65	4,54	/	/	22,73	/	12,01
Bypass aorto-coronarico isolato: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	3,61	2,93	0	/	/	/	/	/	/	/	1,51
Embolia polmonare: mortalità a 30 giorni dal ricovero	3,85	3,93	6,67	/	13,51	/	3,45	/	0	/	9,28
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	8,46	11,39	14,56	13,93	8,51	11,08	12,84	18,36	22,22	/	8,16
Mortalità a 1 anno nei sopravvissuti a 30 giorni da Infarto Miocardico Acuto complicato da scompenso cardiaco	21,43	/	30,77	/	16,67	/	22,22	/	50	/	16,99
STEMI: Mortalità a 30 giorni	7,1	7,71	11,11	/	6,21	6,34	66,67	/	0	/	8,56
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	6,75	6,52	5,76	7,18	4,24	4,41	7,5	14,25	0	/	6,78
Mortalità a 30 giorni per IMA NSTEMI	6,72	8,46	4,96	5,47	2,89	3,31	6,25	9,02	0	/	4,31
IMA STEMI: mortalità a 1 anno	5,5	6,75	6,67	/	7,49	9,44	33,33	/	0	/	5,91
IMA NSTEMI: mortalità a 1 anno	11,93	15,07	15,56	17,32	9,87	12,39	12,5	20,8	25	/	9,12

Indicatore	P.O. G. Rodolico		P.O. San Marco		A.O. Cannizzaro		ARNAS Garibaldi - Centro		ARNAS Garibaldi - Nesima		Italia
	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,69	1,75	3,77	4,47	1,08	0,95	/	/	0	/	1,46
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	3,01	4,36	13,33	18,58	11,91	16,18	7,14	10,95	2,17	2,66	9,39
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	8,44	8,35	20,34	19,99	13,13	13,15	15,63	16,06	12,41	12,14	11,87
Embolia polmonare: riammissioni a 30 giorni dal ricovero	13,46	11,92	11,63	/	24,24	/	3,57	/	0	/	8,46
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	3,86	3,61	/	/	100	/	/	/	/	/	2,07
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	8,4	12,71	6,67	/	16,96	19,89	21,95	22,88	14,29	/	15,28
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	1,67	2,42	6,67	/	9,87	11,08	11,56	13,49	0	/	9,16
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	5,09	5,19	11,36	/	4,17	3,99	5,34	5,53	0	/	6,88
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	9,82	12,29	1,56	1,81	22,86	/	14,29	/	2,94	3,21	9,14
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	10,48	10,91	15,87	15,63	17,86	/	12	/	12,12	12,58	11,76
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui (UO coerente)	60,63	/	100	/	70,9	/	0	/	76,4	/	79,63
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	2,34	2,24	0,47	0,45	0,56	0,6	0	/	0,82	0,82	1,9
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	0,59	0,55	0,47	0,44	0,56	0,6	0	/	0,27	0,27	1,14
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche in pazienti con colelitiasi in day surgery/one day surgery	2,72	2,48	0	/	1,19	1,14	/	/	13,15	13,88	39,24
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	89,6	88,85	90,39	91,84	96,63	92,71	100	/	90,7	86,22	85,89
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri ORDINARI con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	89,6	88,58	90,39	91,6	96,63	92,64	100	/	90,57	85,99	85,39
Intervento chirurgico per tumore cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	50	/	6,73	5,49	4,12	3,85	8,65	6,31	20	/	2,75

Indicatore	P.O. G. Rodolico		P.O. San Marco		A.O. Cannizzaro		ARNAS Garibaldi - Centro		ARNAS Garibaldi - Nesima		Italia
	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	0,57	0,27	/	/	0	/	/	/	0	/	0,85
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	13,04	/	14,29	/	0	/	0	/	7,84	10,31	5,06
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	6,78	7,31	8,11	7,7	9,09	7,32	/	/	1,78	2,74	3,52
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	4,35	/	0	/	0	/	0	/	2,6	1,88	1,49
Proporzione pazienti sottoposte a ricerca linfonodo sentinella durante ricovero per intervento TM mammella	70,59	/	0	/	87,04	/	/	/	64,76	/	72,04
Proporzione pazienti sottoposte a svuotamento ascellare durante ricovero per intervento TM mammella	0,65	/	0	/	3,09	/	/	/	0,95	/	5,83
Proporzione pazienti con interessamento linfonodale riscontrato durante ricovero per intervento TM mammella	9,15	/	0	/	5,56	/	/	/	28,57	/	14,93
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	3,33	3,45	6,19	5,49	6,25	/	/	/	4,62	4,29	3,61
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	0	/	0	/	0	/	100	/	0,47	0,58	0,68
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	0	/	0	/	0	/	/	/	2	1,72	1,92
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui (UO coerente)	95,58	/	0	/	100	/	/	/	0	/	85,61
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	2,8	2,89	100	/	3,7	3,49	/	/	4,26	3,86	5,07
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	75	74,01	/	/	58,75	50,95	/	/	71,43	/	70,32
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	74,59	/	100	/	64,3	/	/	/	69,44	/	68,25
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	1,89	1,89	100	/	4,27	4,08	/	/	4,65	4,31	4,63

Indicatore	P.O. G. Rodolico		P.O. San Marco		A.O. Cannizzaro		ARNAS Garibaldi - Centro		ARNAS Garibaldi - Nesima		Italia
	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni - con nuove variabili	3,33	3,53	6,19	5,57	6,25	/	/	/	4,62	4,32	3,61
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella - con nuove variabili	77,78	76,15	/	/	60	53,92	/	/	72,22	/	70,16
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 90 giorni	1,22	0,52	/	/	2,04	1,78	/	/	0,69	0,77	2,15
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 90 giorni	14,29	/	10	/	0	/	0	/	14,29	/	9,75
Intervento chirurgico di resezione pancreatica per TM: mortalità a 90 giorni	50	/	11,11	/	33,33	/	/	/	5,26	/	8,16
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	2,89	3,08	3,49	3,53	2,91	3,38	/	/	10,29	9,82	11,81
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	31,27	31,76	30,91	28,09	31,63	28,5	0	/	23,11	25,73	22,19
Parto vaginale: ricoveri successivi durante il puerperio	0,25	0,25	0,34	0,32	0,26	0,26	/	/	0,47	0,46	0,61
Parto con taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1,05	1,08	1,11	1,09	1,31	1,3	/	/	1,28	1,25	1,04
Proporzione di episiotomie nei parti vaginali	10,44	9,72	32,18	31	47,13	47,37	0	/	6,59	6,42	9,06
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0	/	/	/	0	/	0	/	0	/	0,84
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	4,07	3,62	3,57	3,76	5,51	5,96	2,16	1,99	28,57	/	4,67
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore dall'accesso nella struttura di ricovero	52,15	53,19	35,59	34,45	72,13	72,29	56,86	56,47	42,86	/	60,49
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	6,17	5,34	6,25	/	1,22	0,93	12,94	12,91	0	/	3,21
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	2,74	2,74	0	/	0,93	0,92	1,82	1,81	0	/	2,12
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	0	/	0	/	0	/	3,45	3,42	0	/	1,13
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	0	/	/	/	0	/	3,7	3,78	0	/	2,88
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	15,39	/	0	/	20	/	0	/	/	/	1,5
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	13,33	/	2,4	4,98	2,83	4,19	10	/	2,17	3,15	7,31

Indicatore	P.O. G. Rodolico		P.O. San Marco		A.O. Cannizzaro		ARNAS Garibaldi - Centro		ARNAS Garibaldi - Nesima		Italia
	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza	% Adj	% Grezza
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	6,25	/	0	/	0	/	/	/	0	/	2,87